



**Βέργος Ιωάννης,** Ιατρός ΩΡΛ, Λάρισα

Μια πρόσφατη μεγάλη εξατομικευμένη μετανάλυση δεδομένων ασθενών έδειξε ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα βρίσκονταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο επιμόνων συμπτωμάτων χωρίς θεραπεία με αντιβιοτικό, σε σύγκριση με παιδιά με μονόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει μια τάση των παιδιών με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα να μολύνονται με παθογόνα βακτηρίδια, ιδίως με τον *Haemophilus influenzae*. Συγκρινόμενα τα παιδιά με μονόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα με τα παιδιά που είχαν αμφοτερόπλευρη μέση ωτίτιδα είναι πιθανότερο τα τελευταία να έχουν βακτηρίδια στο υγρό του μέσου ωτός και σοβαρότερη φλεγμονή στο τύμπανο.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση γιατί τα παιδιά με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα είναι πιθανότερο να υποφέρουν από επίμονα συμπτώματα, αν δεν τους χορηγηθεί αντιβιοτικό. Γιαυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μονόπλευρο ή το αμφοτερόπλευρο της οξείας μέσης ωτίτιδας, όταν συζητούνται οι θεραπευτικές επιλογές της.

## Βιβλιογραφία

McCormick, David P. MD; Chandler, Stephanie M. MD; Chonmaitree, Tasnee MD. Laterality of Acute Otitis Media: Different Clinical and Microbiologic Characteristics. *Pediatric Infectious*

Disease Journal. 26(7):583-588, July 2007.