

Canesten

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το Canesten είναι αντιμυκητιασικό ευρέος φάσματος. Δρα στα δερματόφυτα, τους ζυμομύκητες, τους ευρωτομύκητες και άλλους μύκητες. Επί πλέον δρα στην τριχομονάδα του κόλπου και σε θετικά κατά Gram βακτηρίδια (στρεπτόκοκκους, σταφυλόκοκκους), καθώς και σε αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς (βακτηριοειδές, αιμόφιλος του κόλπου).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Μυκητιάσεις, κολπίτιδες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Canesten® κολπικά δισκία: 1 κολπικό δισκίο 100 mg επί 6 ημέρες. Canesten® 3 κολπική κρέμα: το περιεχόμενο ενός κολπικού εφαρμοστήρα επί 3 ημέρες. Canesten® 1: 1 κολπικό δισκίο 500 mg εφάπαξ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θεραπεία να συνεχίζεται για τον απαιτούμενο χρόνο ακόμα και αν τα συμπτώματα υποχωρήσουν. Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση μετά 4 εβδομάδες θεραπείας, γίνεται επανεκτίμηση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στην κλοτριμαζόλη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Τοπικό αίσθημα καύσου, ερύθημα, κνησμός, ουρτικάρια, οίδημα, ερεθισμός του κόλπου, συχνουρία.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: Κατά την κύηση, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο, απαιτείται προσοχή στη χορήγηση.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Σε ταυτόχρονη φλεγμονή των χειλέων του αιδοίου και των γειτονικών περιοχών ή σε φλεγμονή της βάλανου και της α-κροποσθίας του ερωτικού συντρόφου από

μύκητες, καθώς και για την αποφυγή αναμολύνσεως, πρέπει να γίνεται και στο σύντρο-φο συμπληρωματική τοπική θεραπεία με Canesten κρέμα.

Σύνθεση

Μορφή

Canesten

κολπικά δισκία

100 mg κλοτριμαζόλη

6 κολπικά δισκία και 1 κολπικός εφαρμοστήρας

Canesten

κολπική κρέμα

CANESTEN

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, -

Κλοτριμαζόλη 2%

Σωληνάριο 20 g κολπικής κρέμας και 3 κολπικοί

εφαρμοστήρες

Canesten *1

κολπικό δισκίο

500 mg Κλοτριμαζόλη 70 mg γαλακτικό οξύ

1 κολπικό δισκίο και 1 κολπικός εφαρμοστήρας

Canesten

κρέμα

Κλοτριμαζόλη 1%

Σωληνάριο 20 g