

Avegon® (Menarini)

Vitamins A+E

Σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: Retinol (Βιταμίνη Α) & Tocopheryl acetate (Βιταμίνη Ε)

Έκδοχα: Sucrose, cacao, polyvidone, talc eudragit E, acacia, aluminium hydroxide, titanium dioxide, (E 171). carnauba, beeswax, gelatine, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, sodium benzoate tricalcium phosphate sorbic acid sodium bisulfate sillicic acid methyl cellulose

Φαρμακοτεχνική μορφή:

Δισκία ζαχαρόπηκτα.

Περιεκτικότητα

Ένα ζαχαρόπηκτο δισκίο περιέχει,

Retinol 25.000 IU, Tocopheryl acetate 10 mg

Περιγραφή -Συσκευασία: Δισκία ζαχαρόπηκτα λευκά. σε κουτί των 30 δισκίων ΒΤ x 30

(blister 3 x 10)

Φαρμακαθεραπευτική κατηγορία

Συνδυασμός βιταμινών Α και Ε

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας MENARINI HELLAS A.E. Αν Δαμβεργη 11Αθνα. Τηλ 8316111-13

Παρασκευαστής BIANEΞ ΑΕ -Εργοστάσιο Β

150 χλμ Λεωφ Μαραθώνας 15344 Παλλήνη Αττικής

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γνωρίζετε ΓΙΑ ΤΟ φάρμακο ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ~

Γενικές Πληροφορίες

Η ρετινόλη είναι απαραίτητη για την σωματική ανάπτυξη την προστασία και ακεραιότητα του επιθηλιακού ιστού και την αναπαραγωγή. Η ρετινάλη μαζί με την ρετινόλη εξασφαλίζουν την όραση στο ημίφως Επίσης η βιταμίνη Α εφαρμόζεται τελευταία στη θεραπεία της ακμής

Η υποβιταμίνωση Α μπορεί να προκαλέσει νυκταλωπία ξηροφθαλμία εξελκώσεις του κερατοειδούς, υπερκεράτωση της επιδερμίδας

Όσον αφορά τη βιολογική σημασία της βιταμίνης Ε δεν είναι απόλυτα γνωστή. Αντιπροσωπεύει το βασικό ρυθμιστή των οξειδοαναγωγικών εξεργασιών στους ιστούς

συμμετέχει στον μεταβολισμό των λιπών και ασκεί προστατευτική δράση στην κυτταρική μεμβράνη ιδιαίτερα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, εμποδίζοντας την αυτοοξειδωση των λιπιδίων τους και την κυτταρόλυση και παρεμποδίζει την παραγωγή νιτροζαμινών

Ενδείξεις

.Αυξημένες ανάγκες ή έλλειψη των βιταμινών Α και Ε

.Αποβιταμίνωση ή υποβιταμίνωση Α και Ε

.Κύηση, γαλουχία

.Δερματοπάθειες, οφθαλμοπάθειες νυκταλωπία ξηροφθαλμία, αιμολυτική αναιμία.

Αντενδείξεις

Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Υπερβιταμίνωση Α, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις για τη χρήση

Γενικά δεν συνιστάται η χορήγηση μεγάλων δόσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων υπερβιταμίνωσης επιβάλλεται η άμεση διακοπή της χορήγησης

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Δεν έχει αναφερθεί επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Η χολεστυραμίνη και το παραφινέλαιο εμποδίζουν την απορρόφηση των βιταμινών Α και Ε. Τα αντισυλληπτικά αυξάνουν τα επίπεδα της βιταμίνης Α στο αίμα, ενώ η βιταμίνη Ε ενισχύει την αντιπηκτική δράση των κουμαρινικών

Δοσολογία

Τρόπος χορήγησης. Τα δισκία μασώνται ή καταπίνονται με λίγο νερό 1-3 σακχαρόπηκτα την ημέρα. ανάλογα με την ηλικία και σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού Η θεραπεία με πλήρη δοσολογία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 μήνες περίπου.

Υπερδοσολογία -Αντιμετώπιση

Δεν έχουν αναφερθεί συμπτώματα υπερδοσολογίας στις συνιστώμενες δόσεις

Τηλ Κεντρου Δηλητηριασεων 210. 77 93 777

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες, όταν εμφανιστούν πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας για να σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.

Συμπτώματα υπερβιταμίνωσης έχουν περιγραφεί μετά τη χορήγηση πολύ μεγάλων δόσεων **Ημερομηνία λήξης του προϊόντος**

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται σε κάθε συσκευασία.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, μην το χρησιμοποιήσετε

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μακριά από τα παιδιά

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών 14/10/1997

www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gelis.gr, www.gkelanto.gr