



Σχοινιωτάκη Ειρήνη , Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος Χανιά, Κρήτη

Το σύνδρομο Lemierre συνήθως προκαλείται από στοματοφαρυγγική φλεγμονή σε υγιείς ενήλικες και οδηγεί σε θρομβοφλεβίτιδα της έσω σφαγίτιδας φλέβας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σηπτική εμβολή και βακτηριαιμία. Ο πιο συνήθης μικροοργανισμός είναι το *Fusobacterium necrophorum*.

Το σύνδρομο Lemierre αναφέρονταν σαν «ξεχασμένη ασθένεια». Στις μέρες μας με την αυξημένη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και τη μειωμένη υποψία για το σύνδρομο, η «ξεχασμένη» αυτή ασθένεια πρέπει να μπει στη διαφορική διάγνωση. Το σύνδρομο Lemierre έχει σημαντική νοσηρότητα. Επιπλοκές εις βάρος των κρανιακών νεύρων σχετίζονται με τη νόσο αυτή και τα τελευταία χρόνια είναι σε συνεχή αύξηση. Από την βιβλιογραφία αναφέρονται για το σύνδρομο αυτό άρθρα σε ιατρικά και μικροβιολογικά περιοδικά αλλά σπάνια σε ΩΡΛ. Με την εργασία αυτή αναδεικνύεται η σοβαρότητα της ασθένειας αυτής και οι διαφορετικές μορφές της.

Μέθοδοι: Παρουσιάζεται μια αναδρομή στην βιβλιογραφία καθώς και 2 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας. Καθένα από αυτά έχει διαφορετική εμφάνιση και νευρολογικές επιπλοκές. Το πρώτο παρουσίασε παράλυση της IX έως και της XII εγκεφαλικής συζυγίας, και το άλλο πολυνευροπάθεια και έμφρακτο του μετωπιαίου λοβού μαζί με άλλες επιπλοκές σε διάφορα συστήματα.

Συμπεράσματα: Η διάγνωση του συνδρόμου Lemierre δεν είναι πάντα δυνατή στην κλινική πράξη ενώ αρκετές φορές οι καλλιέργειες αίματος είναι αρνητικές. Είναι αναγκαία λοιπόν η έντονη κλινική εγρήγορση για την έγκαιρη διάγνωση.

Βιβλιογραφία

Syed,Mohammed Iqbal MD, MRCS;Baring,David MD, MRCS;Addidle,Michael MD, MRCPath;Murray,Craig MD, FRCS Adams, Calum MD,FRCR. Lemierre Syndrome: Two Cases and a Review. Laryngoscope.117(9):1605-1610,September 2007