

PlakOut

Διγλυκονική Χλωρεξιδίνη 0.2% β/β Ζελ αποτελεσματικό για:

Τον ταχύ έλεγχο της οδοντικής μικροβιακής πλά-κας που είναι η κύρια αιτία των νόσων του περιοδοντίου.

Τη φροντίδα της μικροβιακής χλωρίδας της στοματικής κοιλότητας.

Τη μείωση της δράσης των τερηδογόνων μικροβίων. Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία μετά από προσθετικές εργασίες, εφαρμογή ορθοδοντι-κών μηχανισμών, καταπολέμηση αφθών και λοιπών φλεγμονών της στοματικής κοιλότητας. Επίσης στην υποβοήθηση της επούλωσης πληγών μετά από κάθε στοματική επέμβαση.

Πριν τη χρήση του πρέπει να έχει προηγηθεί καλός καθαρισμός της στοματικής κοιλότητας. Καθαρίστε με σωστό βούρτσισμα τα δόντια σας. Τοποθετήστε το Plak Out με τη βοήθεια του δακτύ-λου ή της οδοντόβουρτσας ή απ' ευθείας με το σωληνάριο. Αφήστε το να δράσει για 15 περίπου λεπτά και κατόπιν απομακρύνετε το με πλύση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται 2 φορές την ημέρα για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις 15 ημέρες.

Η παρατεταμένη χρήση του δυνατόν να προκαλέσει χρώση στα δόντια, η οποία φεύγει εύκολα με το βούρτσισμα, χρησιμοποιώντας οδοντόπαστα με υψηλό δείκτη καθαρισμού, όπως η οδοντόπαστα DEPURDENT.

Συστατικά: AQUA, GLYCERIN, HYDROXYETHYL CELLULOSE, POLYSORBATE 80. CHLORHEXIDINEDIGLUCONATE. AROMA.CITRIC ACID, ASPARTAME. SODIUM HYDROXI-DE, CI 14720, BENZYL BENZOATE, EUGENOL, GERANIOL. Κυκλοφορεί επίσης σε στοματικό διάλυμα 0,12% για καθημερινή χρήση.

Κέντρο Δηλητηριάσεων: Τηλ.:210 7793777

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα από την Π.Ν. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ (Εργοστάσιο Α)

Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής

OMEGA PHARMA HELLAS S.A. 19^ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας 14671 Νέα Ερυθραία „
Τηλ.: 2108161334. Fax: 2108161674

web site: www.omega-pharma.gr e-mail: contact@omega-pharma.gr