

Musco-Ril® (θειοκολχικοσίδη Thiocolchicoside) (Synthelabo-Lavipharm)

Μυοχαλαρωτικό -Αντιφλεγμονώδες -Αναλγητικό

Μορφές: Κάψουλες, ενέσιμο διάλυμα IM,-γέλη, υπόθετα.

Φαρμακολογικές ιδιότητες:

Η θειοκολχικοσίδη είναι ένα ημισυνθετικό θειοπαράγωγο της κολχικοσίδης, ενός γλυκοσίδη του κολχικού, προικισμένο με μία έκδηλη δράση στη σύσπαση των μυών και στερούμενο δράσης ανάλογης του κουραρίου.

Έχει αποδειχθεί ότι η θειοκολχικοσίδη έχει δράση αγωνιστική των GABA υποδοχέων.

Η παρουσία αυτών των υποδοχέων σε διαφορετικά επίπεδα του νευρικού συστήματος μπορεί να εξηγήσει τη δράση της θειοκολχικοσίδης τόσο στις μυϊκές συστολές κεντρικής προέλευσης, όσο και σ' αυτές αντανakλαστικού τύπου, ρευματικές και τραυματικές.

Η αντιφλεγμονώδης και περιφερική αναλγητική δράση του Musco -Ril μπορεί να εξηγηθεί από την αναστολή των τοπικώς αποδεσμευμένων νευρικών κυττάρων και από την παρατηρηθείσα τοπική αναισθητική δράση.

Χορηγούμενη από το στόμα ή ενδομυϊκά, η θειοκολχικοσίδη επιφέρει προοδευτική χαλάρωση των υπερτονικών μυϊκών ομάδων στις ρευματικές παθήσεις με μυϊκή σύσπαση. Χορηγούμενη τοπικά η θειοκολχικοσίδη ασκεί χαλαρωτική, αντιφλεγμονώδη και αναλγητική

δράση γι' αυτό ενδείκνυται για την θεραπεία των ρευματικών παθήσεων του σκελετικού μυϊκού συστήματος.

Ενδείξεις: Επώδυνες καταστάσεις που συνοδεύονται από μυϊκό σπασμό, όπως οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις ή οι τραυματικές βλάβες της σπονδυλικής στήλης (οσφυαλγία, ριζίτιδα, ισχυαλγία).

ΓΕΛΗ: Πιθανώς αποτελεσματικό σαν βοηθητική θεραπεία στις

α) Οξείες ή χρόνιες ρευματοπάθειες, φλεγμονώδεις ή μη όπως: ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, οσφυο-ισχυαλγία

β) Καταστάσεις άλγους από μυϊκό σπασμό

γ) Νευραλγίες και ραιβόκρανο

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στο φάρμακο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Διάρροια, επιγαστραλγία. Σε παρεντερική χορήγηση έχουν αναφερθεί διέγερση ή καταστολή.

Προσοχή στη χορήγηση:

Μείωση της δόσης σε εμφάνιση γαστρεντερικών διαταραχών. Ο ασθενής να παραμένει κλινήρης μισή τουλάχιστον ώρα μετά τη χορήγηση.

Δοσολογία:

.ΦΥΣΙΓΓΕΣ: 2 φύσιγγες την ημέρα, ενδομυϊκώς.

.ΥΠΟΘΕΤΑ: 2 υπόθετα την ημέρα (πρωί/βρόδυ).

.ΚΑΨΟΥΛΕΣ: 4-6 κάψουλες την ημέρα σε 3-4 δόσεις μετά τα γεύματα.

.GEL: 1-3 επαλείψεις την ημέρα με μικρή ποσότητα που απορροφάται γρήγορα

χωρίς εντριβή.

Συνθεση -συσκευασία:

.Κάψουλες: *Thiocolchicoside 4 mg*.

Έκδοχα: Starch, Lactose, Magnesium stearate, Titanium dioxide; Tartrazine, Gelatine.

Κουτί των 20 καψουλών.

.Φύσιγγες ενέσιμες IM: *Thiocolchicoside 4 mg* Έκδοχα: Sodium chloride, Water for injection.
Κουτί των 10 φυσιγγων των 2 ml.

.Γέλη: *Thiocolchicoside 2.5 mg/g*.

Έκδοχα: Ethanol, Carbopol, Triethanolamine. Σωληνόριο 40 g.

.Υπόθετα: *Thiocolchicoside 8 mg*. Έκδοχα: Aerosil 200, Witepsol H₁₅. Κουτί των 6 υποθέτων.

"Μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης, που γράφεται στο κουτί του".

.Όλα τα *φάρμακα φυλάσσονται μακριά* από τα παιδιά και σε *μέρος δροσερό αλλά χωρίς υγρασίας*

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: SVNTHELABO-LAVIPHARM A.E. Αγ. Μαρίνας, Παιανία, Αττικής, Τηλ.: 210 66 91 000