

**Hexalen®**(Εξετιδίνη, *Hexetidine*) (*Pfizer*)

### **Αντιμικροβιακό -Αντιμυκητιακό διάλυμα**

**Μορφή - Σύνθεση:** Διαυγές κόκκινο διάλυμα που περιέχει' Hexetidine 0,1% w/v, Ethanol, Polysorbate 60, Methyl Salicylate, Clove 0;1, Menthol, Anise Oil, Peppermint Oil, Cineole, Saccharin Sodium, Amaranth E123, Citric Acid Monohydrate, Water.

**Κύρια Φαρμακολογικά Δεδομένα:** Η εξετιδίνη προσφέρει αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή δράση ευρύτατου φάσματος διότι ανταγωνίζεται τη Βιταμίνη Β, (θειαμίνη), ουσία απαραίτητη για την ανάπτυξη των μικροβίων. Η άμεση δράση του παρατείνεται μέχρι και 8 ώρες. Λόγω της χημικής συγγένειας της εξετιδίνης με τις πρωτεΐνες του βλεννογόνου της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, προσροφάται άμεσα από αυτόν και αποβάλλεται με πολύ αργό ρυθμό από τις πάσχουσες περιοχές. Δεν ερεθίζει το βλεννογόνο και δεν αναπτύσσει ανθεκτικούς μικροοργανισμούς.

**Ενδείξεις:** Για την τοπική θεραπεία των λοιμώξεων του στόματος, του φάρυγγα και των συνεπειών τους (φλεγμονές). Σε: κυνάγχη, φαρυγ-γίτιδα, αμυγδαλίτιδα, άφθες, μυκητιάσεις, ερπητοειδή έλκη

Τοπική αγωγή σε ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες, πυόρροια, περιοδοντικά αποστήματα, κακοσμία στόματος προληπτικά ή σε περιπτώσεις μόλυνσης και φλεγμονών μετά από εξαγωγές και οδοντοχειρουργικές ή οδοντο-προσθετικές εργασίες.

Μετά από κακώσεις και χειρουργικές επεμβάσεις.

**Αντενδείξεις:**Επειδή το προϊόν περιέχει μινθόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 2 χρόνων.

**Ανεπιθύμητες ενέργειες:**Καμία. Δεν είναι τοξικό φάρμακο στη συνιστώμενη δοσολογία

**Προειδοποιήσεις:** Μόνο για τοπική χρήση Να μην καταπίνεται

**Χορήγηση κατά την κύηση:**Το φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται κατά την περίοδο αυτή.

**Τρόπος χρήσης:**Το Hexalen χρησιμοποιείται ΑΝΑΠΑΙΩΤΟ. Ξεπλύνετε ή κάνετε γαργάρα για μισό λεπτό με μία κουταλιά της σούπας αναραιωτο Hexalen, 2-3 φορές την ημέρα μετά το φαγητό, εκτός αν υπάρχει ιατρική οδηγία που διαφέρει. Για τη θεραπεία εντοπισμένων φλεγμονών του στόματος χρησιμοποιείστε Hexalen πάνω σε βαμβάκι ή γάζα, επαλείφοντας τοπικά στο σημείο της φλεγμονής

**Λήψη υπερβολικής Δόσης –Αντιμετώπιση:**

Σε περίπτωση τυχαίας ή ηθελημένης κατάποσης υπερβολικά μεγάλης ποσότητας Hexalen, συνιστάται πλύση στομάχου, χορήγηση αλατούχων καθαρτικών και γενική συμπτωματική αντιμετώπιση.Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777.

**Φύλαξη:** Φυλάσσεται σε σκοτεινό και δροσερό χώρο. Τα φάρμακα να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

**Χρόνος ζωής:** Πριν τη χρησιμοποίηση του φαρμάκου, **συμβουλευτείτε την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.**

Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

## HEXALEN

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, -

---

Συσκευασία: Φιάλες των 200ml

Χορηγείται και χωρίς ιατρική συνταγή.

**Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:** PFIZER HELLAS A.E., Αλκέτου5, 11633Αθήνα, τηλ 210 7517981-3