

Betadine**Betadine**[Ιωδιούχος Ποβιδόνη, *Povidone iodine (Mundidone)*]

Τα σκευάσματα **Betadine** δρουν επιφανειακά και ασκούν τις αντισηπτικές ιδιότητες του ιωδίου. Το δραστικό τους συστατικό, το Povidone Iodine, κατά την επαφή του με τους ιστούς απελευθερώνει βαθμιαίως ιώδιο.

Η μικροβιοκτόνος δράση του **Betadine** καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηριδίων, μυκο-βακτηριδίων, ιών και μυκήτων καθώς και ορισμένα πρωτόζωα, παράσιτα και σπόρους.

Τα σκευάσματα **Betadine** είναι υδροδιαλυτά, έχουν την ικανότητα να εισέρχονται στις μικρότερες πτυχές του δέρμα-τος και των βλεννογόνων και η δράση τους δεν επηρεάζεται παρουσία αίματος, πύου ή νεκρωμένων ιστών. Ακόμη, έχουν αποσμητική και αντιπιτυριδιακή ενέργεια. Δρουν γρήγορα (30"-90"), δεν αναπτύσσουν ανθεκτικά μικροβιακά στελέχη, δεν εμποδίζουν την επούλωση των τραυμάτων και δεν προκαλούν τοπικό ερεθισμό ή εγκαύματα. Έχουν παρατεταμένη διάρκεια δράσης, τόση όσο διαρκεί ο χρωματισμός του δέρματος (περίπου 4 ώρες και ανάλογα με τη μορφή του σκευά-σματος). Ο χρωματισμός του δέρματος και των ρούχων είναι προσωρινός και αφαιρείται εύκολα με νερό.

- **Betadine solution** (Povidone iodine 10%)

Ενδείξεις:-Προεγχειρητική και μετεγχειρητική αντισηψία. -Μικροβιακές ή μυκητιασικές δερματικές λοιμώξεις. -Αντισηψία τραυμάτων, εκδορών, ελκών. Το Betadine solution, όταν στεγνώσει σχηματίζει πάνω στο δέρμα ένα προστατευτικό φιλμ.

Συσκευασία: Φιαλίδια των 30 ml και των 240 ml.

- **Betadine ointment** (Povidone iodine 10%)

Ενδείξεις: Αντισηψία τραυμάτων και εγκαυμάτων 1ου, 2ου, και 3ου βαθμού.

Αντισηψία του δέρματος κατά την εφαρμογή καθετήρων, ενδοφλεβίων εγχύσεων ή παρακεντήσεων. Άτονα έλκη, έλκη εκ κατακλίσεως.

Συσκευασία: Σωληνάρια των 30 g -Γάζα των 210 g.

- **Betadine surgical scrub-skin cleanser** □ □ □

(Povidone iodine 7,5%).

Το Betadine surgical scrub-skin cleanser δημιουργεί με νερό πλούσιο αντισηπτικό αφρό. Χρησιμοποιείται δε για την πλήρη απολύμανση και τον καθαρισμό του δέρματος.

Ενδείξεις: -Προεγχειρητική αντισηψία χεριών του προσωπικού του χειρουργείου.
-Αντισηψία χεριών ιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτικού προσωπικού ή άλλων προσώπων που έρχονται σ' επαφή με ασθενείς.

-Για την απολύμανση και τον καθαρισμό οιασδήποτε περιοχής του σώματος,
-Σμηγματοροϊκή δερματίτις. -Ακμή

Συσκευασία: Φιάλες των 1000 ml- Φιαλίδια των 100 ml

- **Betadine** □ **antiseptic paint -alcoholic solution (Αλκοολικό διάλυμα Povidone iodine 10%)** □ □

- **Ενδείξεις:-**Για την πρόληψη και θεραπεία δερματικών λοιμών ξενών. Η αλκοολική

βάση του διαλύματος, αλλά και η μορφή της συσκευασίας με το πινελάκι καθιστούν το Betadine antiseptic paint -alcoholic solution ιδιαίτερα χρήσιμο σε καταστάσεις, όπως μυκητιασικές λοιμώξεις και ερπητικές λοιμώξεις.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 8 ml με πινελάκι'

- **Betadine gargle-mouthwash (Povidone- iodine 1 %)** Το Betadine gargle-mouthwash χρησιμοποιείται σε πλύσεις

του στόματος και γαργαρισμούς για την αντισηψία της στο- ματοφαρυγγικής κοιλότητας. Φονεύει βακτήρια, μύκητες, ιούς, αποστειρώνει το στόμα και εξαλείφει την κακοσμία.

Ενδείξεις και οδηγίες χρήσεως:

Οδοντιατρική: εξαγωγές οδόντων, στοματίτις, άφθες, επεμβάσεις, ουλίτις, παροδοντοπάθεια, δυσοσμία στόματος.

Παθολογία-Ωτορινολαρυγγολογία:

Φαρυγγίτις, λαρυγγίτις, αμυγδαλίτις, κρυολόγημα, γρίπη, μετά από αμυγδαλεκτομή Στις παραπάνω περιπτώσεις το **Betadine gargle-mouthwash** χρησιμοποιείται αδιάλυτο, τρεις ή περισσότερες φορές την ημέρα.

Για την υγιεινή του στόματος: Προστατεύει από μεταδοτικές λοιμώξεις. Εξαλείφει την κακοσμία και δροσίζει το στόμα σε εμπύρετες, μετεγχειρητικές ή άλλες νοσηρές καταστάσεις. Χρησιμοποιούμενο καθημερινώς εξασφαλίζει ευχάριστη και δροσερή αναπνοή.

Για την υγιεινή του στόματος το **Betadine® gargle-mouthwash** χρησιμοποιείται αραιωμένο με δύο μέρη νερό.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 240 ml.

ΜΟΡΦΕΣ Betadine® ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Betadine Vaginal Gel (Povidone Iodine 10%). Σωληνάκια 85 g, συνοδευόμενα από πλαστικό προωθητήρα.

Betadine® Vaginal Douche (Povidone Iodine 10%). Φιαλίδια 240 ml.

Betadine® Vaginal® Suppositories (pessaries). Κάθε κολπικό υπόθετο περιέχει Povidone Iodine 200 mg. Κουτιά 14 υποθέτων.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Γενικώς τα σκευάσματα **Betadine®** είναι καλώς ανεκτά και δεν προκαλούν παρενέργειες. Σπάνια προκαλούν εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων.

Αντενδείξεις: Παιδιά ηλικίας κάτω των 30 μηνών (κίνδυνος υποθυρεοειδισμού), θυρεοειδοπάθειες, υπερευαισθησία στο ιώδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: α) Να αποφεύγεται η κατάποση. β) Η χρήση σε παιδιά μεταξύ 30 μηνών και 5 ετών να γίνεται μόνο όταν υπάρχει απόλυτος ένδειξη και με ιατρική συνταγή. γ) Η μακρά χρήση επί εγκαυμάτων επιφανείας μεγαλύτερης του 20% εγκυμονεί κινδύνους μεταβολικής οξέωσης.

Αλληλεπιδράσεις: Τα σκευάσματα **Betadine®** δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως με υδραργυρικό αντισηπτικό. Να αποφεύγεται η επαφή με χειρουργικό

εργαλεία, σίδηρο, άργυρο ή υδράργυρο.

Οδηγίες φύλαξης: Όλα τα σκευάσματα **Betadine[®]** πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό χώρο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ:

Σε περίπτωση τυχαίας ή σκόπιμης λήψεως υπερβολικής ποσότητας **Betadine[®]** από του στόματος συνιστάται χορήγηση

γάλακτος ή φυτικού ελαίου ή διαλύματος αμύλου, ή πλύση στομάχου με διάλυμα θειοθειικού νατρίου 1-3%. (Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 7793777).

www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gelis.gr, www.gkelanto.gr