



Μάργαρης Ιωάννης Ιατρός, ΩΡΛ, Αμαλιάδα

Η παραδοσιακή μέθοδος αξιολόγησης της μικροβιακής χλωρίδας που σχετίζεται με την οξεία βακτηριδιακή ρινοκολπίτιδα έχει στηριχτεί στις παρακεντήσεις του γναθιαίου άντρου, τη λήψη δειγμάτων των έκκρισεων που υπάρχουν μέσα σ' αυτό και την καλλιέργειά τους. Η παρακέντηση του ιγμορείου θεωρείται ο χρυσός κανόνας για τη λήψη καλλιεργειών και χρησιμοποιείται ως μέθοδος ταυτοποίησης βακτηριδιακών παθογόνων στις αντιμικροβιακές δοκιμές. Η Παρακέντηση του ιγμορείου δεν χρησιμοποιείται συχνά, διότι προκαλεί δυσφορία στον ασθενή και λόγω τεχνικών δυσκολιών [1].

Οι καλλιέργιες εκκρίσεων ου λαμβάνονται από το ρινοφάρυγγα είναι ισοδύναμες με τις καλλιέργειες εκκρίσεων που λαμβάνονται από ένα ιγμόρειο άντρο, μετά από παρακέντησή του, σε ενήλικες [2].

Οι έρευνες μετά από παρακέντηση υγιών παραρρινίων κόλπων έδειξαν ότι οι κοιλότητές τους είναι στείρες μικροβίων. Βάσει αυτού του ευρήματος θα μπορούσε να οριστεί ως παραρρινοκολπίτιδα η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία έχει καταργηθεί η στειρότητα μικροβίων ενός ή περισσοτέρων παραρρινίων κόλπων [3].

Βιβλιογραφία

1. Benninger MS, Appelbaum PC, Denneny JC, Osguthorpe DJ, Stankiewicz JA. Maxillary

Written by Μάργαρης Ιωάννης Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αμαλιάδα - Last Updated Saturday, 14 June 2014 21:01

sinus puncture and culture in the diagnosis of acute rhinosinusitis: the case for pursuing alternative culture methods.

Otolaryngol Head Neck Surg.

2002 Jul;127(1):7-12.

2. [Mandal R](#) , [Patel N](#) , [Ferguson BJ](#) . Role of antibiotics in sinusitis. [Curr Opin Infect Dis.](#)
2012 Apr;25(2):183-92.

3. Evans FO Jr, Sydnor JB, Moore WE, Moore GR, Manwaring JL, Brill AH, Jackson RT, Hanna S, Skaar JS, Holdeman LV, Fitz-Hugh S, Sande MA, Gwaltney JM Jr. Sinusitis of the maxillary antrum.

Engl J Med.

1975 Oct 9;293(15):735-9.

N